



# Detección de Eyaculación Retrógrada

## Preparación del Paciente

- Para esta prueba diagnóstica el paciente deberá abstenerse de la eyaculación (masturbación o sexo) durante un mínimo de 2 días y un máximo de 3 días antes de la recolección de la orina, que se hará luego de una eyaculación.
- El día anterior a su entrevista en el Fertility Center of Miami deberá comenzar a tomar pastillas de bicarbonato por vía oral cada 6 horas.

## Por favor, siga este horario:

06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

12 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

18 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

24 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

## El día de su cita en el Fertility Center Of Miami

Para realizar este procedimiento deberá orinar aproximadamente 1 hora antes de su cita.

Siga los siguientes pasos:

1. Primero, deberá masturbarse y recoger una muestra de semen en un frasco estéril provisto por el Centro.
2. Luego, deberá orinar en otro frasco estéril.
3. Entregar ambas muestras en el laboratorio.

**Fernando M. Akerman, M.D. | Farah S. Chuong, M.D. | Edward H. Illions, M.D. | Nicole Arencibia, A.P.R.N.**



**(305) 596-4013**

[info@fertility-miami.com](mailto:info@fertility-miami.com)

### **Miami**

8950 N. Kendall Dr  
Suite 103  
Miami, FL 33176

### **Miami Beach**

4308 Alton Rd  
Suite 760  
Miami Beach, FL 33140

### **Oficina Administrativa**

9570 S.W. 107 Ave  
Suite 203  
Miami, FL 33176