



Detección de Eyaculación Retrógrada

Preparación del Paciente

- Para esta prueba diagnóstica el paciente deberá abstenerse de la eyaculación (masturbación o sexo) durante un mínimo de 2 días y un máximo de 3 días antes de la recolección de la orina, que se hará luego de una eyaculación.
- El día anterior a su entrevista en el Fertility Center of Miami deberá comenzar a tomar pastillas de bicarbonato por vía oral cada 6 horas.

Por favor, siga este horario:

06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

12 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

18 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

24 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

06 hs: Tome una pastilla de bicarbonato de sodio (650 mg) por vía oral.

El día de su cita en el Fertility Center Of Miami

Para realizar este procedimiento deberá orinar aproximadamente 1 hora antes de su cita.

Siga los siguientes pasos:

1. Primero, deberá masturbarse y recoger una muestra de semen en un frasco estéril provisto por el Centro.
2. Luego, deberá orinar en otro frasco estéril.
3. Entregar ambas muestras en el laboratorio.



(305) 596-4013

info@fertility-miami.com

Miami

8950 N. Kendall Dr
Suite 103
Miami, FL 33176

Miami Beach

4308 Alton Rd
Suite 760
Miami Beach, FL 33140

Oficina Administrativa

9570 S.W. 107 Ave
Suite 203
Miami, FL 33176