

¿Por qué se realiza el histerosalpingograma (HSG)?

Un daño sufrido en las trompas de Falopio y/o útero puede interferir con el pasaje de espermatozoides, óvulos y embrión impidiendo el desarrollo de un embarazo. El HSG es un procedimiento diagnóstico que permite identificar un bloqueo en las trompas de Falopio. También puede detectar defectos en el útero como cicatrices, miomas, pólipos o malformaciones congénitas.

¿En qué consiste el procedimiento?

El radiólogo inyecta una pequeña cantidad de material de contraste dentro del útero por medio de un pequeño catéter colocado en el cuello uterino. Se inyecta suficiente contraste como para permitir la visualización de la cavidad uterina y el pasaje a través de las trompas de Falopio en una pantalla de rayos X.

El derrame del contraste se observa en cada trompa si las mismas están abiertas. Un bloqueo de una o ambas trompas se puede confirmar ante la ausencia del paso del contraste. El procedimiento puede causar dolor pélvico y sangrado vaginal mínimo.

¿Dónde se realiza el procedimiento?

El HSG se puede realizar en varios lugares:


- Baptist Outpatient Center- Medical Arts Building en el 2do piso.
- Baptist Hospital Main- Ciertas pacientes, deben hacer su procedimiento de HSG en el hospital a causa de razones médicas.

Todos los centros de diagnóstico de Baptist Health requieren una prueba de embarazo (de sangre) no más de 4 días antes de la cita

- Mount Sinai Medical Center- Ellos le harán una prueba de embarazo (de orina) el día de su cita.
- Otras localizaciones basadas en las exigencias de su seguro médico.

Preguntas sobre su seguro médico

En la mayoría de los casos, la histeroscopia se considera un procedimiento diagnóstico. Nuestro personal estará complacido de asistirle a verificar su cobertura de seguro médico y cuál es su responsabilidad.



¿Cómo prepararse para un HSG?

- Llamar el primer día del período para confirmar su cita. Usualmente el histerosalpingograma se programa entre los días 6 al 10 de su ciclo menstrual.
- Debe evitar el sexo a partir del primer día de su período hasta después del procedimiento. Si no lo hace, el procedimiento será reprogramado para otro ciclo menstrual.
- Puede tomar 600-800 mg de Advil o Motrin 30 a 60 minutos antes del procedimiento.
- Si no tiene cobertura médica para hacer prueba de sangre de embarazo en nuestra oficina, puede pedirle a nuestro personal clínico una orden para ir a su laboratorio de preferencia.
- Importante: debe informar a la coordinadora si tiene cualquier condición médica tal como asma, prolapso de la válvula mitral (soplo cardíaco), diabetes, o alergia al yodo, látex o mariscos.